


امدة : ٣ ساعات

### إختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة وأحياء

أجزاء الأول :

التمرين الأول :



تنقل السائلة العصبية بين الجهاز العصبي و مختلف أعضاء الجسم بواسطة بنيات خاصة ، الوثيقة (1) تبين مقطع عرضي تم إنجازه على مستوى هذه البنى .

- 1-تعرف على هذه البنى الممثلة في الوثيقة(1) .



تشمل الوثيقة (2) الدعامة النسيجية لنقل الرسالة العصبية في العضوية .

- 1-إعطاء عنواناً للوثيقة .

- 2-تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 9 .


3-تعرف على الأجزاء (أ) و(ب) و(ج) وموقعها في هذا النسيج .

تمثل الوثيقة (3) تسجيلان إرتسما على شاشة الأوسيلوغراف خلال دراسة دقيقة للنشاط العصبي .




- ١-ضع عنوانا لكل تسجيل .
- ٢-حدد موضع إلكترودي الإستقبال ق ١ ، ق ٢.
- ٣-بين التسجيل الذي نتج عن النبض الفعال ؟
- ٤-أرسم حالة الليف العصبي (توزيع + أو - ) المناسبة لكل تسجيل .
- ٥-بين بالرسم ، التسجيلات الملاحظة على شاشة الأوسيلوغراف في حالة إحداث سلسلة من التنبهات الفعالة المتزايدة الشدة لنفس الليف العصبي . ماذا تستنتج ؟

التمرين الثاني :



- أ. تتمثل الوثيقة (١) نتائج فحص مجهرى لقطع فى مبيض حيوان ثدي .
- ب-تعرف على البيانات المرقمة .
- ج-أين يتم إفراز هرمونات المبيض ؟
- د-علل تسمية المبيض بالغدة الصماء ؟





١١. أ-تم تأمين ارتباطات دموية بين الفارة (A) المستأصلة المبيض والفارة (B) المستأصلة الفص الأمامي النخامي كما في الوثيقة (٢) .  
الملاحظة: تطور المبيض والرحم للفارة (B) وتوقف نمو رحم الفارة (A) .
  - ب-حقنت الفارة (B) بمستخلص الفص الأمامي للغدة النخامية أي هرمون LH و FSH .  
الملاحظة: عودة نمو المبيض والرحم .
  - ج-تم تخريب منطقة تحت السيرير البصري للفار (A) .  
الملاحظة: ضمور المبيض ورحم الفارة (B) .
  - ما هي المعلومات التي تستخلصها من هذه التجارب ؟
- التمرين الثالث :

إن الألعاب الأولمبية التي أجريت في مكسيكو (المكسيك) ، وهي مدينة تقع على ارتفاع 2235 م من سطح البحر ، لوحظ فيها أن زمن السباقات تزايدت بالمقارنة مع تلك التي أجريت في مناطق أخرى واقعة على مستوى سطح البحر . ولأجل فهم ومعرفة سبب هذه الظاهرة نقترح عليك الدراسات التالية :

الارتفاع الحمراء	الكريات الدموية الحمراء / مم <sup>3</sup>	عدد الكريات الحمراء / مم <sup>3</sup>	كمية خضاب الدم
مستوى سطح البحر	5,4 مليون	100	
1500 م	4,5 مليون	110	
4300 م	6,6 مليون	114	

عضلة أثناء النشاط	عضلة أثناء الراحة	الكمية مقدرة بالكلغ من العضلة خلال دقيقة
1040 مل	225 مل	حجم الدم المار عبر العضلة / مل
115 مل	8,4 مل	حجم الأوكسجين المستهلك / مل
190 مل	15,5 مل	الغلوکوز المستهلك / مل



-من خلال تحليلك للوثائق، قدم تفسيرا علمياً لسبب تزايد زمن السباقات في مكسيكو .

#### الجزء الثاني:

أختبر أحد التمارين .

#### التمرين الرابع:

1-عرف مايلي:

الهرمون ، الغدة الصماء ، الجسم الأصفر ، العصيون ، السائلة العصبية .

2-فسر مايلي :

-الهرمونات المبيضة تؤثر على الرحم .

-الليف العصبي المستقطب .

-تزايد الحاجة للأوكسجين والغلوکوز خلال النشاط .

التمرين الخامس :

زوج أحد المربين بين سلالتين من الماعز ، أحدهما: قليلة التناسل غزيرة الحليب والثانية : كثيرة التناسل قليلة الحليب ، فتحصل على سلالة كثيرة التناسل قليلة الحليب .

١-ماذا تستنتج ؟

٢- مثل على الصبغيات النمط الوراثي للأبوبين وأفراد الجيل الأول .

زوج المربى بين أفراد الجيل الأول .

٣- ما هي النتائج المتوقعة في الجيل الثاني ؟

٤- حدد النمط الظاهري والمورثي للسلالة المرغوبة .

## التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة وأحياء

### المستوى : الأولى ثانوي

#### التمرين الأول:

الوثيقة 01:

الشكل 01: جسيمات خلوية ، الشكل 02: النخاع الشوكي .

الوثيقة 02:

1- العنوان : رسم تخطيطي لعصيون (خلية عصبية).

2- البيانات: 1. نواة 2. غشاء هيللي 3. هيللي 4. زوارد (تفرعات) شجيرية 5. محور أسطواني 6. غمد النخاعين 7. غمد شوان 8. اختناق رانفير 9. نهايات عصبية .

3- الأجزاء : أجسام خلوي يتواجد على مستوى المادة الرمادية .

ب- ليف عصبي يتواجد على مستوى المادة البيضاء .

ج- ليف عصبي يتواجد على مستوى العصب .

الوثيقة 03:


1- تسجيل 1: كمون راحة ، تسجيل 2: كمون عمل .

2- تسجيل 1: في 0 ملي فولط : ق 1 و ق 2 على السطح ، في 70- ملي فولط : ق 1 على السطح و ق 2 داخل المقطع (الليف) .  
تسجيل 2: ق 1 على السطح و ق 2 داخل المقطع .

3- التسجيل الذي نتج عن التبيه هو التسجيل 2.



5- نشاط الليف العصبي خاضع لقانون الكل أو اللا شيء .



#### التمرين الثاني :

أ- البيانات: 1- جريب أولي 2- جريب ثانوي 3- إياضة 4- جسم أصفر 5- وعاء دموي .

ب- يتم إفراز هرمونات المبيض في الدم .

ج- الأعضاء المتاثرة بهرمونات المبيض هي الرحم .

يتمثل تأثيرها في نمو بطانة الرحم وزيادة سمكها .

د-يسمي المبيض غدة صماء لأنها يصب مفرزاته في الدم .  
ال المعلومات : نستخلص أن الغدة النخامية هي التي تتحكم في نشاط المبيض والرحم عن طريق إفراز FSH و LH .

### التمرين الثالث:

تحليل الوثائق:

-يمثل الجدول تغير عدد الكريات الدموية الحمراء وكمية خضاب الدم بدلالة الارتفاع :

كلما ابتعدنا عن مستوى سطح البحر كلما زاد عدد الكريات الحمراء وبالتالي زادت كمية خضاب الدم .

-يمثل الجدول حجم الدم والأوكسجين والغلوكوز المستهلك من طرف العضلة أثناء الراحة والنشاط : عند بذل جهد يزداد استهلاك العضلة للجلوكوز والأوكسجين كما يزداد حجم الدم المار عبرها .

-يمثل المنحنى أقصى حجم للأوكسجين بدلالة الارتفاع : كلما زاد الارتفاع كلما نقص حجم الأوكسجين في الوسط .

-تمثل الوثيقة تغير التدفق الدموي والهوائي بدلالة الجهد :

في حالة راحة يكون التدفق الدموي والهوائي ثابت في قيم منخفضة ، عند زيادة الجهد يزداد التدفق الدموي والهوائي .  
التفسير :

يعود تزايد زمن السباقات في مكسيكو إلى ابعادها عن سطح البحر ، حيث عند هذا الارتفاع تقل نسبة الأوكسجين في الوسط وبما أن النشاط يتطلب طاقة ناتجة عن أكسدة الجلوکوز في وجود الأوكسجين ، والتي تنقل عن طريق الدم . ومنه سرعة المتسابقين تقل لنقص الأوكسجين .

### التمرين الرابع :

1-تعريف :

الهرمونون : هو مادة كيميائية تفرز من طرف غدة صماء تنقل مع الدم نحو الأعضاء المستهدفة .

الغدة الصماء : هي الغدة التي تصب مفرزاتها مباشرة في الدم .

الجسم الأصفر : هو ماتبقى من الجريب الناضج بعد الإباضة .

العصيرون : هو الوحدة العصبية الأساسية ، يتتألف من جسم خلوي ، محور أسطواني وتفرعات عصبية .

السيالة العصبية : هي عبارة عن إشارات كهربائية ، تتولد عند إحداث تنبيه .

2-تفسير :

الهرمونات المبيضية تؤثر على الرحم : حيث يحفز الأستروجين نمو بطانة الرحم ، والبروجسترون يزيد من سمكتها .

الليف العصبي مستقطب : يحمل شحنات موجبة على السطح وسلبية داخل الليف .

تزايد الحاجة للأوكسجين والغلوكوز خلال النشاط : خلال النشاط تزداد الحاجة للجلوكوز والأوكسجين من أجل إنتاج الطاقة اللازمة للنشاط .

### التمرين الخامس:

1-نستنتج أن الأبوين نقين وأن الصفات السائدة : كثيرة التناسل و قليلة الحليب ، والصفات المتردية : قليلة التناسل و غزيرة الحليب .

2-تحديد النمط الوراثي للأبوين وأفراد الجيل الأول .

3-النتائج المتوقعة في الجيل الثاني : أفراد ذات أنماط ظاهرية مختلفة :

9/16 ماعز كثيرة التناسل قليلة الحليب .

3/16 ماعز كثيرة التناسل غزيرة الحليب .

3/16 ماعز قليلة التناسل قليلة الحليب .

1/16 ماعز قليلة التناسل غزيرة الحليب .

4-النمط الظاهري للسلالة المرغوبة ماعز كثيرة التناسل غزيرة الحليب ، النمط التكيني : [كاك ق ق ] ، [كا كا ق ق ] .