


الفرض الأول للامتحان الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول (9.5 نقاط) :

يرتكز النمو عند الكائنات الحية على مجموعة من الآليات . لإبراز إحداها تعرض الوثيقة الآتية :



1. سم البيانات المرقمة و عنون الشكلين (أ) و (ب) ثم رتب مراحل الشكل (أ).
2. معتمدا على الوثيقة و معلوماتك اكتب نصا علميا توضح فيه التغيرات التي تمس عنصر الشكل (ب) خلال الظاهرة الممثلة في الشكل (أ).

التمرين الثاني (10.5 نقاط) :

تخزن المادة العضوية في النبات بأشكال مختلفة:


I. يظهر الفحص المجهرى لبذرة الشعير الجافة غير المنتشة بعد تلوينها باليود حبيبات مملثة في الشكل (أ) من الوثيقة 1 و أثناء الإنتاش تأخذ

المظهر الممثل في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

1. اقترح فرضية حول مصدر المادة الضرورية للنمو عند النبتة.

2. تعرف على هذه الحبيبات ثم صف الصور المجهرية


الممثلة في الوثيقة 1.



II. سمحت عملية وزن كمية السكريات المرجعة في بذرة و نبتة الشعير مع مرور الأيام بالحصول على منحنيات الوثيقة 2.

1. حلل و فسر المنحنيين.

2. هل تتوافق النتائج مع الفرضية المقترحة سابقا؟



الإجابة النموذجية

التمرين الأول (9.5 نقاط):

العلامة كاملة	العلامة مجزئة	الجواب	رقم الجواب																				
2	8*0.25	1.تسمية البيانات :	-1-																				
		<table><tr><th>البيان</th><th>الرقم</th><th>البيان</th><th>الرقم</th></tr><tr><td>صفحة خلوية</td><td>5</td><td>جزء مركزي</td><td>1</td></tr><tr><td>هيولي</td><td>6</td><td>كروماتيدا الصبغي</td><td>2</td></tr><tr><td>جدار سيليلوزي</td><td>7</td><td>القلنسوتين القطبيتين</td><td>3</td></tr><tr><td>خيوط المغزل اللالوني</td><td>8</td><td>نواة</td><td>4</td></tr></table>	البيان	الرقم	البيان	الرقم	صفحة خلوية	5	جزء مركزي	1	هيولي	6	كروماتيدا الصبغي	2	جدار سيليلوزي	7	القلنسوتين القطبيتين	3	خيوط المغزل اللالوني	8	نواة	4	
		البيان	الرقم	البيان	الرقم																		
		صفحة خلوية	5	جزء مركزي	1																		
		هيولي	6	كروماتيدا الصبغي	2																		
	جدار سيليلوزي	7	القلنسوتين القطبيتين	3																			
	خيوط المغزل اللالوني	8	نواة	4																			
	عناوين الشكلين:																						
	الشكل أ: رسم تخطيطي لمراحل الانقسام الخيطي المتساوي عند خلية نباتية .																						
	الشكل ب: رسم تخطيطي لصبغي .																						
ترتيب المراحل: B ثم D ثم A ثم C																							
2	4*0.5																						
1	2*0.5																						
1	4*0.25																						
0.5 0.5 2 0.5	0.5	النص العلمي:	-2-																				
	0.5	المقدمة: تعريف النمو والانقسام																					
		المشكل العلمي: ماهي التغيرات التي تمس الصبغيات خلال الانقسام الخيطي المتساوي ؟																					
		العرض :																					
	2*0.25	المرحلة التمهيديّة: تكون الصبغيات مضاعفة، وكل صبغي مكون من كروماتيدين																					
	2*0.25	المرحلة الاستوائية: تنظم الصبغيات المثبتة على خيوط المغزل الالوني في المستوى الاستوائي للخلية																					
	2*0.25	المرحلة الانفصالية: ينفصل كروماتيدا كل صبغي ويهاجر كل منهما الى أحد قطبي الخلية																					
	2*0.25	المرحلة النهائية: تنفصل الخليتين البنيتين و بكل واحدة منهما نفس عدد صبغيات الخلية الأم																					
		الخاتمة :																					
	0.5	0.5	تنمو الخليتين البنيتين ، تحتفظ احدهما بخاصيتها المرستمية و تدخل في انقسام جديد ، بينما تستطيل الخلية الثانية و تتميز من اجل اداء وظائفها.																				

التمرين الثاني (10.5 نقاط):

العلامة كاملة	العلامة مجزئة	الجواب	رقم الجواب	
1	1	اقترح فرضية حول مصدرة المادة الضرورية للنمو عند النبتة هو المدخرات.	-1-	الجزء الأول:
1	2*0.5	التعرف على هذه الحبيبات : حبيبات النشاء	-2-	
		وصف الصور المجهرية :		
1	2*0.5	الشكل 1 نلاحظ ان حبيبات النشاء تكون واضحة (متكاملة) .		
1	2*0.5	الشكل 2 نلاحظ تأكل حبيبة النشاء (متأكلة) و تحولها الى سكريات بسيطة قابلة للاستهلاك من طرف النبتة من اجل النمو.		

الجزء الثاني:	-1-	التحليل و التفسير : يمثل المنحنيان تغيرات كمية السكريات المرجعة في بذرة و نبيطة الشعير بدلالة الزمن حيث نلاحظ : في بداية الإنتاج تكون كمية السكريات المرجعة في البذرة قليلة و ثابتة و ذلك لأن البذرة في أصلها تحوي على سكر معقد :النشاء في حين تكون منعدمة في النبيطة. بعد مدة وجيزة من الإنتاج تتزايد كمية السكريات المرجعة في البذرة بسبب تفكيك النشاء إلى عناصره البسيطة :جلوكوز وهذا ما يؤدي إلى بداية ظهور هذه السكريات في النبيطة. عند إكتمال الإنتاج تتناقص تدريجيا كمية السكريات المرجعة في البذرة حتى تنعدم لأنها تستعمل إما في تفاعلات الهدم لإنتاج الطاقة اللازمة للنمو أو في بناء التراكيب الأساسية في النبيطة التي تتناقص فيها هي الأخرى كمية السكريات. الاستنتاج : أثناء إنتاج البذرة يتفكك فيها النشاء إلى سكريات مرجعة التي تستعملها النبيطة أثناء نموها و عند نفاذ مدخرات البذرة تصبح النبيطة نبات قادر على صنع غذائها بنفسها بفضل عملية التركيب	0.5 3*0.5 3*0.5 3*0.5	0.5 4.5
	-2-	نعم تتوافق النتائج مع الفرضية المقترحة سابقا.	0.5	0.5