

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول (5ن):

في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد و متجاس ، نعتبر النقط A ، B و I ذات الواحق $z_A = 3 + 2i$ ، $z_B = -3$ و $z_I = 1 - 2i$ على الترتيب.

1.1 علم النقط A ، B و I ، (نكل الرسم طوال التمرين، الوحدة $0.5cm$ $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\|$)

2.1 أكتب على الشكل الجبري العدد $z = \frac{z_I - z_A}{z_I - z_B}$ ، ماذا نستنتج حول طبيعة المثلث IAB ؟

3.1 أحسب z_C لاحقة النقطة C ، صورة النقطة I بالتحاكي الذي مركزه A ونسبته 2 .

4.1 D هو مرشح الجملة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ ، أحسب z_D لاحقة D .

5.1 بين أن $ABCD$ مربع.

2 عين ثم أنشئ Γ_1 مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MA} + \vec{MC}\|$

3 نعتبر المجموعة Γ_2 للنقط M من المستوي حيث: $\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 4\sqrt{5}$.

1.3 بين أن النقطة B تنتمي الى Γ_2

2.3 عين ثم أنشئ المجموعة Γ_2 .

التمرين الثاني (3ن):

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة كما يلي:
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1 بين أنه إذا كانت (u_n) متقاربة نحو عدد حقيقي l ، فإن l هو جذر لثلاثي الحدود: $P(x) = x^2 + x - 6$.

2 عين جذري الثلاثي الحدود P ، نمرز اليهما بـ α و β حيث $\alpha > \beta$

3 من أجل كل n من \mathbb{N} ، نضع $v_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$

1.3 بين أن المتتالية (v_n) هندسية ، يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

2.3 استنتج نهاية المتتالية (u_n) .

التمرين الثالث (4ن):

الفضاء منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $A(1; -2; 4)$ ، $B(-2; -6; 5)$ و $C(-4; 0; -3)$. بين أن النقط A ، B و C ليست في استقامة.

2.1 برهن أن الشعاع $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ناظمي للمستوي (ABC) .

3.1 أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

1.2 2 أكتب تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة O ويعامد المستوي (ABC) .


2.2 عين احداثيات النقطة O' المسقط العمودي للنقطة O على المستوي (ABC) .

3 نسمي H المسقط العمودي للنقطة O على المستقيم (BC) ، t عدد حقيقي بحيث: $\vec{BH} = t\vec{BC}$.

برهن أن: $t = \frac{\vec{BO} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{BC}\|^2}$ ، استنتج العدد الحقيقي t واحداثيات النقطة H .

التمرين الرابع (8):

1 يعطى في الشكل المقابل المنحنيين (\mathcal{J}) و (\mathcal{K}) لدالتين معرفتين وقابلتين للاشتقاق على \mathbb{R} . نعلم أن إحدى هاتين الدالتين هي الدالة المشتقة للأخرى، نمرز اليهما اذن بـ g و g' .



1.1 أرفق كل دالة منهما بتمثيلها البياني.

2.1 على المجال $\left[-\frac{3}{2}; 5\right]$ شكل جدول تغيرات الدالة g .

3.1 ما هو معامل توجيه المماس للمنحني (\mathcal{J}) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

2 لتكن المعادلة التفاضلية $(E): y' + y = 2(x + 1)e^{-x}$

1.2 بين أن الدالة f_0 المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ حل للمعادلة (E) .

2.2 حل المعادلة التفاضلية $(E'): y' + y = 0$.

3.2 بين أن f حل للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة u حيث $u = f - f_0$ حلا للمعادلة (E') .

4.2 استنتج من أجل كل x من \mathbb{R} ، عبارة $f(x)$ عندما تكون f حلا للمعادلة (E) .

5.2 علما أن الدالة g المعرفة في الجزء 1 حلا للمعادلة (E) عين $g(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x .

6.2 عين الحل h للمعادلة (E) الذي تمثله البياني يقبل في النقطة ذات الفاصلة 0 مماسا معامل توجيهه معدوما.

3 هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$

1.3 عين نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$

2.3 نعلم أن الدالة f تقبل الاشتقاق على \mathbb{R} ، عين دالتها المشتقة وأدرس اشارتها، ثم أنجز جدول تغيراتها.

3.3 في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (وحدة الطول 2cm)، نسمي (\mathcal{C}_f) التمثيل البياني للدالة f .

أ عين معادلة لـ (d) مماس المنحني (\mathcal{C}_f) في النقطة ذات الفاصلة -1.

ب أنشئ المماس (d) والمنحني (\mathcal{C}_f) في المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

4.3 لتكن الدالة F المعرفة على \mathbb{R} بـ $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$

أ عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حتى تكون F دالة أصلية لـ f على \mathbb{R} .

ب أحسب مساحة الحيز المحدد بالمنحني (\mathcal{C}_f) وبمحور الترتيب ومحور الفواصل والمستقيم ذي المعادلة $x = 1$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (4ن):

المستوي المركب مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$.
نعتبر النقط A, B و C ذات اللواحق $z_A = 2i$ و $z_B = \sqrt{3} - i$ و $z_C = 2ie^{i\theta}$ على الترتيب، حيث $\theta \in \mathbb{R}$.

1 نضع $\theta = \frac{2\pi}{3}$

1.1 علم النقط A, B و C .

2.1 أحسب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ ، استنتج بدقة طبيعة المثلث ABC .

2 نفرض أن $\theta \in]0; 2\pi[$.

1.2 تحقق من أن $e^{i\theta} - 1 = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$

2.2 استنتج أن $z_A - z_C = 4 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$

3.2 عين θ حتى يكون ABC مثلث متساوي الساقين في A .

التمرين الثاني (4ن):

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} كما يلي:
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$$

1 أحسب u_1 و u_2 .

2 بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : 2 \leq u_n \leq 4$.

2.2 بين أن (u_n) متزايدة.

3.2 استنتج أن (u_n) متقاربة.

3 برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : 4 - u_{n+1} \leq \frac{4 - u_n}{2}$.

2.3 استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : 0 \leq 4 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

3.3 أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثالث (5ن):

نعتبر المستوي (P) المار بالنقطة $B(1; -2; 1)$ و شعاع ناظم له $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ و المستوي (Q) الذي معادلة له: $x + 2y - 7 = 0$.

1.1 برهن أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.

2.1 برهن أن تقاطع (P) و (Q) هو المستقيم (Δ) المار بالنقطة $C(-1; 4; -1)$ و شعاع توجيه له $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3.1 لتكن النقطة $A(5; -2; -1)$ ، أحسب المسافة بين A و (P) ثم المسافة بين A و (Q)

4.1 عين المسافة بين A و (Δ) .

2 من أجل كل عدد حقيقي t نعتبر النقطة M_t ذات الاحداثيات $(1+2t; 3-t; t)$.

1.2 عين بدلالة t الطول AM_t و الذي نسميه ب $f(t)$ و نفرض عندئذ دالة f معرفة على \mathbb{R} .

2.2 أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم حدد قيمتها الحدية الصغرى.

3.2 فسر هندسيا القيمة الحدية الصغرى.

التمرين الرابع (7):

1 نعتبر الدالة العددية g ذات المتغير الحقيقي x و المعرفة كما يلي: $g(x) = -x^2 + 1 - 2\ln|x|$

1.1 أدرس تغيرات الدالة g .

2.1 أحسب $g(-1)$ و $g(1)$ ثم استنتج اشارة $g(x)$.

2 لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R}^* كما يلي: $f(x) = -x + 2 + \frac{1 + 2\ln|x|}{x}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\text{cm}$)

1.2 بين أنه من أجل كل x من \mathbb{R}^* لدينا: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

2.2 أ | أدرس تغيرات الدالة f ثم عين المستقيمات المقاربة ل (C_f) .

ب | نسمي (Δ) المستقيم المقارب المائل ل (C_f) ، أدرس الوضع النسبي ل (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3.2 برهن أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ يكون: $f(-x) + f(x) = 4$ ، ماذا تستنتج؟

4.2 بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $\alpha \in]0, 4; 0, 5[$.

5.2 أ | أنشئ كل من (Δ) و (C_f) .

ب | ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة: $1 - x^2 + x \ln m + 2 \ln|x| = 0$.

6.2 أ | أحسب المساحة $A(\alpha)$ للجزء المستوي المعرف بمجموعة النقط $M(x; y)$ كما يلي:

$$2 - x \leq y \leq f(x) \text{ و } \alpha \leq x \leq e$$

ب | أثبت أن $A(\alpha) = \alpha^4 - 4\alpha^3 + 4\alpha^2 + 9 \text{ cm}^2$



بالتوفيق للجميع