

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية تواتي حمد لخضر  
متقن ميلودي العروسي  
ثانوية بحري بكار

دورة : ماي 2017

المدة : 04 سا

وزارة التربية الوطنية  
مديرية التربية ولاية الوادي  
امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي  
الشعبة : رياضيات.

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

### الموضوع الأول

التمرين الأول: (4 نقاط)

(1) حل في  $Z^2$  المعادلة التالية ذات المجهول  $(x; y)$  :  $6x - 5y = 7$

(2) عين الأعداد الصحيحة النسبية  $a$  بحيث :  
$$\begin{cases} a \equiv 3[5] \\ a \equiv -4[6] \end{cases}$$

(3) أ- عين حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة  $2^n$  على 5

ب- أثبت من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أن :  $x^n \equiv 2^n [5]$

ج - عين قيم العدد الطبيعي  $n$  حيث :  $x + x^2 + x^3 + \dots + x^n \equiv 2 [5]$

(4) العدد الطبيعي  $\overline{1438}$  مكتوب في نظام التعداد ذي الأساس  $\alpha$

جد أصغر قيمة للعدد الطبيعي  $\alpha$  بحيث يكون :

$$2017^{2018} + 8^{2016} + \overline{1438} \equiv 0 [5]$$

التمرين الثاني: (5 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  نعتبر النقط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب

$$Z_C = Z_A + Z_B, \quad Z_B = 2 + 2\sqrt{3}i, \quad Z_A = 2\sqrt{3} - 2i$$

(1) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب  $Z_C$

(2) أ- ليكن  $\theta$  عمدة للعدد المركب  $Z_C$

باستعمال العلاقتين التاليتين:  $\cos(2\theta) = 2(\cos \theta)^2 - 1$  و  $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \times \cos \theta$

ا- أثبت أن :  $\arg(Z_C) = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$

ب - أكتب  $Z_C$  على الشكل المثلثي ثم الأسى

ج - عين الأعداد الطبيعية  $n$  بحيث يكون  $(Z_C)^n$  حقيقي ، ثم استنتج أن  $(Z_C)^{2028}$  عدد حقيقي

(3)  $(E)$  مجموعة النقط  $M$  صورة  $Z$  في المستوي المركب حيث :

$$(Z - 2\sqrt{3} + 2i)(\bar{Z} - 2\sqrt{3} - 2i) = Z_B \times \bar{Z}_B$$

أ- برهن من أجل كل عدد مركب  $Z$  أن :  $Z \times \bar{Z} = |Z|^2$

ب) تحقق أن النقطة  $C$  من  $(E)$  ثم حدد مجموعة النقط  $(E)$  .

(4)  $(\tilde{E})$  مجموعة النقط  $M$  صورة  $Z$  في المستوي المركب حيث :

$$Z = 2 + 2\sqrt{3}i + 4e^{i\theta} \quad , \quad (\theta \text{ حدد حقيقي})$$

عين المجموعة  $(\tilde{E})$  ثم تحقق أن النقطة  $C$  من  $(\tilde{E})$

(5) أ- حدد طبيعة التحويل النقطي  $R$  مع ذكر عناصره المميزة الذي يرفق بكل نقطة  $M(Z)$  من المستوي النقطي

$M(\tilde{Z})$  والمعرف ب- :  $(\tilde{Z} - Z_C) = e^{-i\frac{\pi}{2}} (Z - Z_C)$

ب- تحقق أن  $(\tilde{E})$  هي صورة  $(E)$  بالتحويل  $R$  .

### التمرين الثالث: (4 نقاط)

- في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  نعتبر النقط  $A(1, 1, -1)$ ,  $B(1, 1, 0)$ ,  $I(1, 0, 0)$  و  $J(0, 1, 0)$  و  $K(0, 0, 1)$
- المطلوب : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية مع التعليل :
- (1) النقط  $I, A, J$  و  $K$  تنتمي إلى : (أ) مستقيم واحد (ب) مستو واحد (ج) لا تنتمي إلى مستو واحد
  - (2) معادلة المستوي  $(IAB)$  هي: (أ)  $x = 1$  (ب)  $y = 1$  (ج)  $z = -1$
  - (3) (S) سطح كرة مركزها O و نصف قطرها  $\frac{1}{2}$ , المستقيم  $(IJ)$ : (أ) يقطع السطح (S) (ب) لا يقطع السطح (S) (ج) يمس السطح (S)
  - (4) مجموعة النقط M من الفضاء التي إحداثياتها  $(x, y, z)$  تحقق:  $(x + y - z + 1)^2 + (y + x)^2 = 0$  هي تمثل : (أ) مستقيم (ب) مستوي (ج) مجموعة خالية

### التمرين الرابع: (7 نقاط)

- I-  $g$  الدالة المعرفة على  $[0; +\infty[$  كمايلي :  $g(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$
- أدرس تغيرات الدالة  $g$  ، ثم استنتج إشارتها .
- II-  $f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  ب :  $f(x) = e^x \times \ln(1 + e^{-x})$
- وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- (1) بوضع:  $t = e^{-x}$  بين أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x)f = 0$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  ثم فسر النتائج هندسيا .
  - (2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $\hat{f}(x) = e^x \times g(e^{-x})$
  - (3) استنتج اتجاه تغيرات الدالة  $f$ . ثم شكل جدول تغيراتها .
  - (4) أرسم المنحنى  $(C_f)$  ( تعطى  $-0.7$  فاصلة نقطة انعطاف للمنحنى  $(C_f)$  )
  - (5) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  أن :  $\hat{f}(x) - f(x) = \frac{-e^x}{e^{x+1}}$  ثم استنتج دالة أصلية لـ  $f$  على  $\mathbb{R}$
  - ب- أحسب مساحة الحيز في المستوي المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  و المستقيمت  $x = 0$  ،  $x = 1$  و  $y = 0$
  - (6) ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة :  $\ln(1 + e^x) - m e^{-x} - x = 0$
  - (7) بين من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[-1; 0]$  لدينا :  $0 \leq \hat{f}(x) \leq g(e)$
  - (8) بين أن المعادلة  $f(x) + x = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث  $\alpha \in ]-1; 0[$
- III- نعتبر المتتالية  $(u_n)$  المعرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  حيث  $u_0 = 0$  و  $u_{n+1} = -f(u_n)$
- 1- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_n \in [-1; 0]$
  - 2- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $|u_{n+1} - \alpha| \leq g(e) |u_n - \alpha|$
  - 3- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $|u_n - \alpha| \leq [g(e)]^n$
  - 4- احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  ، ( تعطى :  $g(e) \simeq 0.6$  )

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول : (04 نقاط)

$(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $u_0 = 2$  ومن أجل كل  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_{n+1} = \frac{2}{3} u_n + \frac{1}{3} n + 1$

- 1 - أ) أحسب الحدود  $u_1, u_2, u_3$   
 ب) ضع تخميناً حول اتجاه تغير  $(u_n)$
- 2 - أ) برهن بالتراجع ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_n < n + 3$   
 ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$
- 3 - لتكن المتتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $v_n = u_n - n$   
 أ) برهن أن المتتالية  $(v_n)$  هندسية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول  $v_0$   
 ب) أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج  $u_n$  بدلالة  $n$   
 ج) هل المتتالية  $(u_n)$  متقاربة.
- 4 - نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n + 2v_n$   
 بين أن :  $S_n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 6$

### التمرين الثاني : (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ ، نعتبر النقط  $A(-7; 0; 4)$  ،  $B(2; 1; 3)$

$C(3; 2; 4)$  و  $D(-3; -6; 6)$  والمستوي  $(p)$  معادلته  $2x - 3y + z - 4 = 0$

- 1- تحقق أن النقطتين  $B$  و  $C$  من المستوي  $(p)$
- 2- بين  $(p)$  هو المستوي المحوري للقطعة  $[AD]$
- 3- أكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم  $(AD)$
- 4- تحقق أن النقطة  $H(-5; -3; 5)$  هي نقطة تقاطع المستقيم  $(AD)$  والمستوي  $(p)$
- 5- علماً أن حجم الرباعي  $ABCH$  هو 10 (وحدة حجم). استنتج مساحة المثلث  $BCH$
- 6- أ) بين أن التمثيل الوسيطى للمستوي  $(p)$  معرف بـ :  $\begin{cases} x = \alpha + 7\lambda + 2 \\ y = \alpha + 4\lambda \\ z = \alpha - 2\lambda \end{cases}$  و  $\alpha$  و  $\lambda$  عددين حقيقيين

ب) لتكن  $M$  نقطة كيفية من المستوي  $(p)$ ، أثبت أن الجداء  $\vec{AM} \cdot \vec{AD}$  مستقل عن الوسيطين  $\alpha$  و  $\lambda$   
 ج) عين قيمتي  $\alpha$  و  $\lambda$  بحيث تكون المسافة  $AM$  أصغر ما يمكن ثم استنتج هذه المسافة

### التمرين الثالث : (05 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلتين ذات المجهول  $Z$  حيث:

$$(1) \quad Z^3 - 2Z^2 + 5Z = 0 \quad , \quad (2) \quad Z^3 + Z^2 + 4Z + 4 = 0$$

- I - 1 - بين إذا كان  $Z_0$  حلاً للمعادلة (1) فإن  $(Z_0 - 1)$  حلاً للمعادلة (2).
- 2 - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (1) ثم استنتج حلول المعادلة (2)
- II المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(\vec{o}; \vec{u}; \vec{v})$  نعتبر النقط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب :  $Z_A = -1$  ،  $Z_B = 1 + 2i$  ،  $Z_C = 1 - 2i$

- 1 - أكتب على الشكل الأسى العدد المركب  $\frac{Z_B - Z_A}{Z_C - Z_A}$  ثم استنتج طبيعة المثلث ABC
- 2 - استنتج تحويلًا  $T$  في المستوي المركب يحول النقطة  $C$  إلى النقطة  $B$  والنقطة  $A$  إلى نفسها مع ذكر عناصره المميزة
- 3 - عين لاحقة النقطة  $G$  مركز ثقل المثلث ABC
- 4 -  $h$  التحويل النقطي في المستوي الذي يحول كل نقطة  $M(z)$  من المستوي إلى النقطة  $\acute{M}(\acute{z})$   
المعرف بالعلاقة :  $\overrightarrow{MM} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$   
(أ) أثبت أن :  $\overrightarrow{GM} = 4 \overrightarrow{GM}$   
(ب) أكتب الصيغة المركبة للتحويل  $h$  وحدد طبيعته مع ذكر عناصره المميزة
- 5 - (أ) التحويل  $S$  المعروف بـ :  $S = T \circ h$  هو تشابه مباشر يطلب نسبته وزاويته .  
(ب) أحسب مساحة المثلث  $\acute{A}\acute{B}\acute{C}$  صورة المثلث ABC بالتحويل  $S$
- 6 - عين قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون :  $\underbrace{SOSO \dots OS}_{(n \text{ مرة})}$  تحاكيا نسبته موجبة.

#### التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I - لتكن  $g$  دالة معرفة على المجال  $]0, +\infty[$  بالشكل :  $g(x) = 1 - e^{1-x} + \ln x$   
1- أدرس تغيرات الدالة  $g$  و شكل جدول تغيراتها .  
2- أحسب  $g(1)$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$  .
- f - II دالة معرفة على المجال  $[0, +\infty[$  كما يلي :  $\begin{cases} f(x) = e^{1-x} + x \ln x & : x > 0 \\ f(0) = e \end{cases}$   
وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$   
1- (أ) بيّن أن  $f$  مستمرة على يمين الصفر .  
(ب) أدرس قابلية اشتقاق  $f$  على يمين الصفر .  
2- (أ) أحسب نهاية الدالة  $f$  عند  $+\infty$  .  
(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .  
3- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  وفسر النتيجة هندسيا ثم أنشئ  $(C_f)$  .  
4 - (أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب :  $\int_1^e x \ln x \, dx$   
(ب) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ  $(C_f)$  و المستقيمت التي معادلاتها :  $x = 1$  ,  $x = e$  و  $y = 0$
- 5 - (أ) عين قيم العدد الحقيقي الموجب تماما  $m$  التي من أجلها تقبل المعادلة  $f(x) = f(m)$  حلين في المجال  $[0, +\infty[$  ( تعطى  $f(2.66) \simeq e$  )  
(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة :  $e \left( \frac{1}{e^x} - 1 \right) = m + x \ln \left( \frac{1}{x} \right)$
- III -  $h$  الدالة المعرفة على المجال  $[0, +\infty[$  بـ :  $h(x) = \ln [f(x)]$   
1- أحسب  $h'(x)$  بدلالة  $g(x)$  و  $f(x)$  ثم استنتج إشارة  $h'(x)$   
2- شكّل جدول تغيرات الدالة  $h$  .