

ثانوية كريم بلقاسم - البويرة
الاربعاء 13 نوفمبر 2019
المدة: ساعة و نصف

مديرية التربية لولاية البويرة
الفرض الأول للفصل الأول
القسم: 3 تقني رياضي

المادة: رياضيات

$$g(-1,3) > g(-1,2) < 0$$

مهمة: الجزء الأول:

لتكن الدالة العددية g المعرفة على \mathbb{R} بـ $g(x) = 1 + x + e^x$

1) أدرس اتجاه تغير الدالة g .

2) برهن أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل في \mathbb{R} حالاً وحيداً α تتحقق أن α من المجال $[-1,3; -1,2]$.

3) حدد تبعاً لقيم x إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $f(x) = \frac{xe^x}{1+e^x}$ ، نسمى (C_f) المنحنى البياني لها في معلم متعادم ومتجانس $(O; i, j)$ ، (وحدة الطول هي 4cm)

1) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(1+e^x)^2}$$

ج) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

2) برهن أن $f(\alpha) = 1 + \alpha$ ثم عين حصراً $f(\alpha)$

3) برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً (Δ) معادلته $x = y$ عند $+ \infty$.

4) أكتب معادلة الماس (T) للمنحنى (C_f) عند التقاطة O .

ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمماس (T) .

5) نعتبر الدالة h المعرفة على $[0; +\infty)$ كما يلي: $h(x) = (x-1)e^x - 1$

ا) ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم بين ان المعادلة $0 = h(x)$ تقبل حل وحيد هو $-\alpha$

ب) بين ان المنحنى (C_h) يقبل ماساً وحيداً (D) يوازي المستقيم (Δ) في نقطة A يتطلب تعين احداثياتها

ج) بين ان $1 = (-\alpha) - 1$ ثم استنتاج ان $\alpha + 1 = y = x + 1$ معادلة للماس (D) .

6) أرسم (Δ) ، (T) و (D) و (C_f) في المعلم السابق.

7) نقاش بياني، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $xe^x = (x-m)(1+e^x)$

الجزء الثالث:

نعتبر الدالة k المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ $k(x) = f(-\ln x)$

1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} k(x)$.

2) باستعمال مشتق مركب دالتين . عين اتجاه تغير الدالة k . (دون تعين عبارة (x') بدالة x)