



## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



مديرية التربية لولاية تبسة  
ث. أبي عبيدة عامر بن الجراح تبسة  
الأستاذة : بraham عواطف  
دورة ماي 2021

وزارة التربية الوطنية  
امتحان البكالوريا التجريبية  
الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 04 ساعه نصف

اختبار في مادة: علوم الطبيعة و الحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

( المقترن من طرف الأستاذة : بraham عواطف )

### الموضوع الأول

#### التمرين الأول : الاسترجاع المنظم للمعارف ( 05 نقاط )

يعتمد مجال زراعة الأعضاء على تحديد نسبة قبول الطعام و التي تقل كلما كان المعطي و المستقبل متباعدين و راثيا ، إلا أنه و في بعض الحالات يلجأ الأطباء إلى استعمال المثبتات المناعية للتغلب على مشكلة رفض الطعام لدى المرضى في حالة عدم توفر المعطي المناسب .

- من خلال الاسترجاع المنظم و المهيكل لمعارفك ، اشرح في نص علمي تأثير المثبتات المناعية على نمط الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعام ، مع اقتراح إجراءات وقائية مصاحبة لاستعمالها.

**ملاحظة :** يجب مراعاة منهجية الإجابة من أجل تحرير مقال علمي مهيكل : مقدمة - عرض - خاتمة .

#### التمرين الثاني : استدلال علمي ( 07 نقاط )

بينت العديد من الدراسات أن النشاط الإنزيمي يتطلب بنية فراغية خاصة به تسمح بأداء وظيفة محددة ، فهل كل اختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي حتما إلى اختلاف في وظائفها ؟  
ل والإجابة على هذا المشكل العلمي المطروح نقترح عليك الدراسة التالية :

##### الجزء الأول :

أجرى فريق من الباحثين دراسة تجريبية حول إنزيم غلوكوز أكسيداز (GO) عند فطر الأسبرجيلوس و فطر بنسييليوم و الذي يحفز التفاعل الكيميائي التالي :



النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة 01: حيث يمثل الشكل (أ) بعض الخصائص البنوية للإنزيم GO عند الفطريين تم الحصول عليها بواسطة المبرمج Rastop ، بينما يمثل الشكل (ب) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة البيبتيدية لإنزيم GO عند كل فطر أخذت من المبرمج Anagène.

إنزيم غلوكوز أكسيداز (GO)			
البيتيسيلينوم	الأسبرجيلوس		
587	581	عدد الأحماض الأمينية	
25	26	عدد البنى التأمينية $\alpha$	
24	71	عدد البنى التأمينية $\beta$	
Cys <sub>168</sub> — Cys <sub>210</sub>	Cys <sub>164</sub> — Cys <sub>206</sub>	جسر ثانوي الكبريت	
Arg <sub>516</sub> , His <sub>520</sub> , His <sub>563</sub> , Asp <sub>428</sub>	Arg <sub>512</sub> , His <sub>516</sub> , His <sub>559</sub> , Asp <sub>424</sub>	الأحماض الأمينية للموقع الفعال	
(الشكل (أ))			
(الشكل (ب))			
الوثيقة (01)			

- 1- بالاعتماد على معطيات الوثيقة 01 ، قدم استدلاً علمياً توضح فيه قدرة إنزيم GO على تحفيز نفس التفاعل ( القيام بنفس الوظيفة ) عند الفطريين رغم اختلاف البنية .


## الجزء الثاني :

في دراسة مكملة ، تم قياس النشاط الإنزيمي للغلوكوز أكسيداز GO بعد إحداث طفرات على مستوى الـADN المشفّر له عند الفطريين السابقين و ذلك مقارنة بالنشاط الإنزيمي للسلالة الطبيعية في الشروط الملائمة ( $Ph = 7^{\circ}C$  و  $25^{\circ}C$ )

النتائج المتحصل عليها في كل حالة مماثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 02 ، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة بنية موقع الفعال لإنزيم GO الطبيعي عند الفطريين.

النتائج: السرعة الأعظمية للنشاط $V_{max}$ الإنزيمي	الأحماض الأمينية للإنزيم GO			رقم التجربة
	نتائج الاستبدال عند السلالات الطافرة	Penicillium عند طفراة (سلالة طبيعية)	Aspergillus عند طفراة (سلالة طبيعية)	
% 100		بدون طفراة	بدون طفراة	1
% 32	Phe	Tyr <sub>73</sub>	Tyr <sub>68</sub>	2
% 7.2	Ala	Asp <sub>428</sub>	Asp <sub>424</sub>	3
% 1.1	Ala	His <sub>520</sub>	His <sub>516</sub>	4
% 3.5	Gln	Arg <sub>516</sub>	Arg <sub>512</sub>	5
% 58.2	Thr	Asn <sub>518</sub>	Asn <sub>514</sub>	6

(الشكل (أ))



(الشكل (ب))

الوثيقة (2)


- 1- فسر النتائج التجريبية المحصل عليها باستغلالك لمعطيات الوثيقة 02 ومن معلوماتك .
- 2- قدم إجابة ملخصة للمشكل العلمي المطروح في بداية التمرين انطلاقاً مما توصلت إليه من هذه الدراسة .

### التمرين الثالث : استدلال علمي في إطار مسعى علمي ( 08 نقاط )

تؤمن المبلغات العصبية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك ، لكن يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان ( كالمخدرات ) ، و لمعرفة كيفية تأثيرها على عمل المشبكي نقترح الدراسة التالية:

#### الجزء الأول

بريجابالين ( Pregabalin ) المعروف باسمه التجاري ليريكا ( Lyrica ) هو عبارة عن مسكن للألم الأعصاب والعظام ، يسبب الإدمان في حال تعاطي جرعات عالية لذا يعتبر هذا الدواء من ضمن الأدوية المحظورة التي لا تصرف إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب مختص ، تمثل الوثيقة 01 ( الشكل 01 ) صور تركيبية للشكل الفراغي لكل من جزيئة بريجابالين و جزيئة ال GABA ، أما الشكل 02 من نفس الوثيقة فيوضح نتائج قياس التوترات الكهربائية للخلايا بعد مشبكية الواردة لمرادك الألم على مستوى الدماغ لشخص سليم وشخص مصاب بالتهاب الأعصاب الطرفية ( شخص يعاني من آلام مزمنة ) و شخص مصاب بعلاج بمادة Pregabalin و ذلك في غياب أي تنبية .




1- بالاعتماد على شكلي الوثيقة 01، اقترح فرضيتين تفسر بهما آلية تأثير مادة Pregabalin على انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبكي.

#### الجزء الثاني :

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين ، تم قياس كل من تركيز شوارد الكالسيوم في سيتو بلازم الخلية العصبية قبل المشبكية و كذا تركيز المبلغ الكيميائي المنبه لكل من شخص سليم وشخص مصاب بالتهاب الأعصاب الطرفية ( شخص يعاني من آلام مزمنة ) و شخص مصاب بعلاج بمادة Pregabalin ، النتائج موضحة في الشكلين 01 و 02 من الوثيقة 02 ، أما الشكل 03 من نفس الوثيقة فيمثل رسومات تخطيطية لمظهر الحويصلات في الخلية قبل مشبكية لمشبكي منبه في غياب و بوجود مادة البريجابالين .

تركيز دهارد  $\text{Ca}^{2+}$  على مستوى

الخلية قبل المثبطة



الشكل 01

تركيز الأستينيل كربون

في ذلك الشخص



الشكل 02

## الوثيقة 02

في وجود مادة البريغابالين

الشكل 03

في غياب مادة البريغابالين

- باستغلالك لأشكال الوثيقة 02، ناقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقاً .
- حدد دور البريغابالين في المجال الطبي و في حالة الإدمان .

## الجزء الثالث:

من خلال ما توصلت إليه في الدراسة السابقة و بالاعتماد على معلوماتك ، بين برسم تخطيطي وظيفي آلية تأثير مادة البريغابالين على عمل المشابك مبرزا دور البروتينات في الاتصال العصبي

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول : الاسترجاع المنظم للمعارف ( 05 نقاط )

يتم تركيب البروتين وفق آليات التعبير المورثي وذلك بتدخل عوامل النسخ FT ( facteurs de transcription ) و أي اختلال في هذه العوامل قد يكون مصدرا لاختلال في التعبير المورثي ( تركيب البروتين ) حيث تعرف عوامل الاستنساخ FT بأنها بروتينات ترتبط بموقع محددة من الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين ADN وظيفتها تنظيم التعبير المورثي عن طريق :

- تنظيم نسخ المورثات بتنشيط أو تثبيط إنزيم ARN polymérase .
  - تنظيم نشاط إنزيم histone acétyltransférase الذي يقلل ارتباط الهيستونات بالADN مما ينشط عملية الاستنساخ.
  - تنظيم نشاط إنزيم histone désacétylase الذي يزيد من ارتباط الهيستونات بالADN مما يثبط عملية الاستنساخ.
- من خلال الاسترجاع المنظم والمهيكل لمعارفك ، اشرح في نص علمي الاختلال الذي يمكنه أن يحدث في آليات التعبير المورثي في حال وجود خلل على مستوى عوامل الاستنساخ FT أو الإنزيمات التي تربطها بها علاقة وظيفية.

ملاحظة : يجب مراعاة منهجية الإجابة من أجل تحرير مقال علمي مهيكل : مقدمة - عرض - خاتمة .


### التمرين الثاني : استدلال علمي ( 07 نقاط )

من المعلوم أن توليد كمون العمل و اطراح المبلغ العصبي في الفراغ المشبكي يعتمد على عمل القنوات الفولطية الخاصة بشوارد  $Na^+$  ،  $K^+$  و  $Ca^{++}$ ، وأي خلل في هذه القنوات الفولطية يصاحبه ظهور أمراض عضوية .(Canalopathie Musculaire )

#### الجزء الأول :

اكتشف الباحث أولنبرغ سنة 1886 مرض التشنج العضلي التوتري ( خلل في التقلص العضلي Paramyotonie congenitale PMC )، حيث تظهر أعراض هذا المرض عندما يصبح الشخص بعمر 40 سنة و تبقى الأعراض مدى الحياة، وقد تكون خطورة هذا المرض أكبر وتسمى MAP . تم أيضا اكتشاف مرض الشلل الدوري ( المؤقت ) و يسمى بمرض ويستفال PPHYPOK

توضح الوثيقة 01 تأثير القنوات الفولطية لشوارد الكالسيوم على النقل المشبكي في حالة المشبك المنبه SE ، بينما تبين الوثيقة 02 آلية عمل القنوات الفولطية الخاصة بشوارد الصوديوم .




1- بالاعتماد على معطيات الوثيقة 01 و بعد التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 ، حدد أهمية عمل القنوات الفولطية الخاصة بشوارد  $\text{Ca}^{++}$  .

2- بين آلية المراقبة للقنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{Na}^+$  مبرزا سبب ظهور أمراض عضوية كالتشنج العضلي و الشلل المؤقت من خلال الوثيقة 02.

### الجزء الثاني :

في تجربة الكمون المفروض على ليف عصبي معزول لحيوان الكالamar تم الحصول على التسجيل الموضح في الشكل 1 من الوثيقة 03 أما الشكل 2 من نفس الوثيقة فتمثل النتائج المحصل عليها و الناتجة عن الكمون المفروض.



يبين الجدول الموالي الطفرات الحادثة على مستوى المورثات المسؤولة على تركيب القنوات الفولطية المدروسة في هذا التمررين ( الوثيقة 04).

الوثيقة 04			
$\text{Ca}^{++}$	$\text{K}^+$	$\text{Na}^+$	القنوات الفولطية
طفرة في المورثة CACNLA1S قناة فولطية طافرة من نوع T704M لا يتم اطراح المبلغ العصبي شلل دوري (مؤقت)	طفرة في المورثة SCN4A قناة فولطية طافرة من نوع G1306V لا يحدث التيار الخارج تشنج عضلي شديد	طفرة في المورثة SCN4A قناة فولطية طافرة من نوع R1448H لا يحدث التيار الداخلي تشنج عضلي	الخلل الحادث المرض

1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 03 ، قدم تفسيرا لسبب المرض في كل حالة من الحالات الموضحة في جدول الوثيقة 04.

2- مما سبق ، وضع العلاقة بين المورثة و البروتين .

### التمرин الثالث : استدلال علمي ضمن مسعى تجريبي ( 08 نقاط )

تستمل العضوية خلايا و جزيئات بروتينية عالية التخصص للدفاع عن الذات لكن في بعض الأحيان يختل النشاط الوظيفي لهذه العناصر ما يؤثر سلبا على صحة العضوية ، نقترح في هذا التمرين دراسة مثال يوضح عواقب اختلال

مناعي


الجزء الأول :

(Hemophagocytic lymphohistiocytosis)HLH هو مرض مناعي يشبه مرض السرطان في طبيعته و طريقة علاجه و هو من الأمراض النادر الإصابة بها ، قد يصيب أي فئة عمرية لكنه شائع بين الأطفال صغار السن خاصة مادون السنة بنسبة 70% . تتمثل أعراض المرض في :


- تضخم الغدد اللمفاوية، الكبد و الطحال .
- ظهور طفح جلدي و تغيرات عصبية مثل (تشنجات ، تصلب في الرقبة .....)
- مشاكل في الرئة و في الجهاز الهضمي .

لمعرفة سبب هذا المرض نقدم لك المعطيات التالية :

يبين الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسم تخطيطي لصورة تبين نشاط خلية لمفاوية (س) عقب دخول فيروس إلى العضوية ، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل سطح الغشاء الهيولي للخلية المصابة الناتج عن نشاط الخلية المفاوية (س).



تجربة : تم تتبع نشاط الخلية (س) عن طريق قياس كمية الكروم المشع المحررة في الوسط لأوساط تحتوي على خلايا مصابة و خلايا LTc بنسب متزايدة ( لفرد غير مصاب ب HLH أو فرد مصاب ) ، النتائج موضحة في الوثيقة 02.



1- باستغلالك للشكل (أ) من الوثيقة 01، اشرح نشاط الخلية المفاوية (س) الذي نتج عنه ظهور الغشاء الهيولي الممثل في الشكل (ب) من نفس الوثيقة .

2- بالاعتماد على النتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة 02، اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب العجز المناعي الملاحظ عند الأفراد المصابين بمرض HLH .

## الجزء الثاني:


للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين نقدم المعطيات التالية :

### - معطيات علمية :

يتم تصنيع بروتين البرفوريين في البداية في حالته غير النشطة في الخلايا الملفاوية الثانية السامة ، ويصبح نشطاً عندما يتم قطع بيبتيد قصير - C طرفي لبروتين البرفوريين على مستوى الحبيبات السامة للخلايا . الكاتيبيسين (cathepsine) عبارة عن جزيئات بروتينية (بروتياز) مرتبطة بالحبيبات السامة (حيوصلات البرفوريين) ، حيث تم إظهار أن حمض الخلايا الملفاوية الثانية السامة مع مثبط الكاتيبيسين أدى إلى تثبيط ملحوظ لموت الخلايا المستهدفة .

### - تجربة :

قمنا بجسم نوعين من البروتينات (وسم مناعي) cathepsine (فلورة حمراء) و perforine (فلورة خضراء) في خلايا LTC لفرد سليم و آخر مصاب بمرض HLH . النتائج موضحة في الوثيقة 03 . أما الوثيقة 04 فيمثل الشكل (أ) منها جزء من الأليل PRF1 المسؤول عن تركيب البرفوريين عند طفل سليم و آخر مصاب ، والشكل (ب) يمثل جدول الشفرة الوراثية .



- 1- استخرج المعلومة التي تقدمها المعطيات العلمية
- 2- انطلاقاً من الاستغلال المنظم للوثائق و باستدلال منطقي ، بين سبب العجز المناعي الملاحظ عند الأفراد المصابين بمرض HLH ، ثم صادر على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقاً.

## الجزء الثالث:

لخص في مخطط مراحل الاستجابة المناعية ضد الخلايا المصابة اعتماداً على مكتسباتك وموظفاً المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة .

انتهى الموضوع الثاني

أستاذة المادة : براهم ع تمنى لتلاميذها الأعزاء كل التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا ، فقط تطلب منكم التركيز و الثقة بالنفس و إتباع إستراتيجية الحل المناسبة .