


\*\*\*\*\*

التمرين الأول:

تيتان (T) هو قمر يدور حول زحل (S) في مدار دائري نصف قطر مساره  
 $r_T = 1,22 \times 10^9 m$  . ندرس حركة هذا القمر في مرجع زحل  
 المركزي الذي نعتبره عطاليا.

(1) ما هي القوة المسؤولة عن حركة تيتان ، اعط عبارتها و مثلها  
 على الرسم.

(2) اوجد عبارة شعاع التسارع  $\vec{a}$ .

(3) اثبت أن حركة تيتان منتظمة.

(4) استنتج عبارة السرعة ، ثم أحسبها.

أونسيلا (E) هو أيضا أحد أقمار زحل ، يدور حوله في حركة دائرية

منتظمة دوره  $T_E = 1,37$  jours ، نصف قطر مداره  $r_E$  .

أ- اكتب عبارة دور القمر بدلالة سرعته  $V_E$  و نصف قطر مداره  $r_E$  .

ب- استنتج القانون الثالث لكبلر.

ج- باستعمال هذا القانون استنتج قيمة  $r_E$  .

(5) يدور كوكب زحل حول نفسه خلال مدة  $T_S = 10h39min$  ، نريد أن نجعل المسبار الفضائي

كاسيني (C) في مدار مستقر بالنسبة لسطح زحل.

أ- ما هي العلاقة بين دور زحل  $T_S$  و دور المسبار كاسيني  $T_C$  .

ب- باستعمال القانون الثالث لكبلر ، أوجد عبارة الارتفاع  $h$  لهذا المسبار عن سطح زحل بدلالة

$R_S$  ،  $T_C$  ،  $M_S$  ،  $G$  . ثم أحسبه.

يعطى :  $R_S = 6 \times 10^7 m$  ،  $M_S = 5,69 \times 10^{26} kg$  ،  $G = 6,67 \times 10^{-11} SI$

التمرين الثاني:

تتفك نواة البولونيوم  $^{210}_{84}Po$  تلقائيا الى نواة الرصاص  $^{206}_{82}Pb$  مع اصدار اشعاع  $\alpha$  .

(1) أكتب معادلة التحول النووي الحادث محددًا  $Z$  .

(2) احسب طاقة الربط النووي  $E_l$  لكل من النواتين  $^{210}_{84}Po$  و  $^{206}_{82}Pb$  ، أي النواتين أكثر استقرار . مع التعليل .

(3) ليكن  $N_0(Po)$  عدد أنوية البولونيوم في عينة عند اللحظة  $t = 0$  و  $N(Po)$  عدد الأنوية المتبقية في نفس العينة  
 عند لحظة  $t$  .

أ) نرمز ب  $N_D$  لعدد أنوية البولونيوم المتفككة عند اللحظة  $t' = 4 \cdot t_{1/2}$  . بين أن عدد أنوية البولونيوم المتفككة  $N_D$

تعطى بالعلاقة التالية:  $N_D = \frac{15}{16} N_0(Po)$  .

ب) يمثل المنحنى الممثل في (الشكل-1) تغيرات  $\left(\ln \frac{N_0(Po)}{N(Po)}\right)$  بدلالة الزمن. اعتمادا على هذا المنحنى، حدد

بالوحدة (jour) زمن نصف العمر  $t_{1/2}$ .

ج) علما أن العينة لا تحتوي على الرصاص عند اللحظة  $t = 0$

، حدد بالوحدة (jour) اللحظة  $t_1$  التي يكون عندها


$$\frac{N(Pb)}{N(Po)} = \frac{2}{3}$$

حيث  $N(Pb)$  هو عدد أنوية الرصاص المتكونة عند هذه اللحظة.

المعطيات:  $m(^{210}_{84}Po) = m(^{206}_{82}Pb) = 205,9295 u$

$$m_p = 1,00728 u \quad m_n = 1,00866 u$$

$$1 u = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$



التمرين الثالث:

نأخذ حجما  $V$  من محلول مائي لحمض الإيثانويك ( $S$ ) تركيزه المولي  $C = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

ونقيس  $pH$  عند الدرجة  $25^\circ C$ . فنجد  $pH = 3,3$ .

1) اعتمادا على جدول التقدّم لتطور التفاعل بين حمض الإيثانويك والماء، عبّر عن التقدّم النهائي  $x_f$

$$\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = C10^{pH} - 1$$

2) استنتج قيمة  $pK_{a1}$  للثنائية  $(CH_3COOH/CH_3COO^-)$ .

3) بيّن أن نسبة التقدّم النهائي  $\tau$  للمحلول الحمضي تُكتب على الشكل  $\tau = \frac{K}{K+10^{-pH}}$  حيث  $K$  هو

ثابت التوازن المقرون بمعادلة هذا التفاعل. ماذا تستنتج؟

4) نأخذ من المحلول ( $S$ ) حجما يحتوي على كمية مادة

$$n(CH_3COOH) = n_0 = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(NH_3) = n_0$$

أ) اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث بين  $CH_3COOH$  و  $NH_3$ .

ب) احسب ثابت التوازن  $K$  المقرون بمعادلة هذا التفاعل.

ج) بيّن أن نسبة التقدّم النهائي  $\tau$  لهذا التفاعل تُكتب على الشكل  $\tau = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$ . ماذا تستنتج بخصوص

هذا التفاعل؟