

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (04,5 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة كما يلي : $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3$

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n < 4$

(ب) ادرس اتجاه تغير (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

(ت) عين نهاية المتتالية (u_n)

2. المتتالية العددية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_{n+1} - u_n = e^{v_n}$

(أ) بين أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

3. (أ) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 4 - \frac{1}{4^{n-1}}$

(ب) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4. أحسب بدلالة n المجموعين S_n و S'_n حيث : $S_n = e^{v_0} + e^{v_1} + e^{v_2} + \dots + e^{v_n}$

$$S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

التمرين الثاني : (04,5 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كريات سوداء مرقمة بـ $(-1, 1, 0, 0, 0)$ و أربع كريات بيضاء مرقمة بـ $(-1, 1, 1, 1)$ و ثلاث

كريات حمراء مرقمة بـ $(-1, 1, 0)$ كل الكريات متماثلة لا نميز بينها باللمس

نسحب عشوائيا ثلاث كرات في آن واحد من الصندوق

(1) احسب احتمال الحوادث الآتية

A " سحب ثلاث كريات من نفس اللون "

B " سحب ثلاث كريات جداء أرقامها معدوم "

C " سحب ثلاث كريات مختلفة الأرقام مثنى مثنى "

(2) بين أن $P(A \cap C) = \frac{1}{55}$ ثم استنتج $P(A \cup C)$

(3) علما أن الكريات المسحوبة مختلفة الأرقام مثنى مثنى ما احتمال أن تكون من نفس اللون .

(4) نعتبر المتغير العشوائي X المرتبط بجداء الأرقام المسجلة على الكريات الثلاث المسحوبة.

(أ) عين قيم المتغير العشوائي X

(ب) عرف قانون احتمال للمتغير العشوائي X

(ت) احسب امله الرياضيائي $E(X)$

(ث) احسب $P(X^2 = 1)$

التمرين الثالث : (04 نقاط)

لكل سؤال من الأسئلة التالية جواب واحد صحيح فقط . عين الإجابة الصحيحة مع التعليل :

1. (u_n) و (v_n) المتتاليتين المعرفتين على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = u_n - 5$ و $v_n = 2^{u_n}$:
 أ) (v_n) متتالية حسابية ، ب) (v_n) متتالية هندسية ، ج) (v_n) متتالية لا هندسية و لا حسابية
 2. نسحب عشوائيا ثلاث كريات بالتتابع دون ارجاع من كيس به سبع كريات حمراء و ثلاث كريات بيضاء و كرة سوداء
 • احتمال سحب كرتين حمراوتين على الأكثر هو

$$\text{أ) } \frac{91}{165} \quad , \quad \text{ب) } \frac{7}{55} \quad , \quad \text{ج) } \frac{26}{33}$$

3. القيمة المتوسطة لدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = (2x+1)\ln x$ على المجال $[e; e^2]$ هي :

$$\text{أ) } m = \frac{e^4 - e^2}{2(e^2 - e)} \quad , \quad \text{ب) } m = \frac{2e^3 + e}{2(e^2 - e)} \quad , \quad \text{ج) } m = \frac{3e^3 + e}{2(e-1)}$$

4. حلول المعادلة التفاضلية $x^2 y' = 2x^2 e^{2x} + 1$ على المجال $]0; +\infty[$ هي :
 أ) $f(x) = e^{2x} + \frac{1}{x} + c$ ، ب) $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \ln x + c$ ، ج) $f(x) = e^{2x} - \frac{1}{x} + c$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

(I) نعتبر g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x - e + e \ln x$

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,54 < \alpha < 1,55$
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$.

(II) لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \left(\frac{x-e}{x}\right) \ln x$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة الأخيرة هندسيا .
2. أ . أثبت أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.
 ب . استنتج اتجاه تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .
3. (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ في المستوى المنسوب إلى المعلم السابق .
 أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x]$ ، فسر النتيجة هندسيا .
 ب) ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ)
4. عين نقاط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل ثم استنتج إشارة $f(x)$ على $]0; +\infty[$.
5. أرسم (Γ) و (C_f) ناخذ $f(\alpha) \approx -0,3$

(III) نعتبر الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $h(x) = x \ln x - \frac{e}{2}(\ln x)^2 - x$

1. بين أن الدالة h هي دالة أصلية للدالة f على $]0; +\infty[$
2. أحسب بالسنتمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين $x = e$ و $x = 1$